

Idegen test szemben, légútban

1. A szembe kerülő idegen test...vált ki. Egészítsd ki a mondatot.
 - a., szemhéjzárás, könnyezés, pislogás
 - b., könnyezés, szájzár, remegés
 - c., szemviszketés, könnyezés, köhögés
2. Könnyezés hatására az idegen test...
 - a., nem tud távozni, orvosi beavatkozás kell
 - b., gyakorlott elsősegélynyújtó el tudja távolítani, a könnyezés nem elég
 - c., távozhat, amennyiben mérete apró
3. Bármilyen tárgy okozta szemsérülés esetén...
 - a., csak a sérült szemre kell fedőkötés

b., mindkét szemre kell fedőkötés, ha csak az egyik szem sérült meg akkor is (a sérült szem nyugalma miatt)

c., az elsősegélynyújtó eldöntheti, hogy kötözi be a szemet

4. Amennyiben kisebb test kerül a légútba az...

a., légúti elzáródást okozhat

b., köhögő rohamot vált ki

c., egy tüsszentéssel kijut

5. Amennyiben nagyobb idegen test kerül légútba az...

a., köhögő rohamot vált ki

b., légúti elzáródást okozhat

c., tüdőgyulladás léphet fel

6. Amennyiben nagyobb idegen test kerül légútba a balesetes fuldoklási folyamata eltarthat akár...

a., 25 percig

b., 3 percig

c., 10 percig

7. Amennyiben az idegen test nem távozik a köhögés hatására alkalmaznunk kell a...

a., stabil oldalfektetést

b., Rautek féle műfogást

c., Heimlich féle műfogást

8. Csecsemő esetén...

a., a két lábánál kell felemelni és a hátára ütni

b., csak orvos tudja ellátni

c., óvatosan kell a lapockák közé ütni az ülő helyzetben lévő csecsemőnél